AVERTISSEMENTS AGRICOLES DLP 23-7-76200945

BULLETIN TECHNIQUE STATIONS D'AVERTISSEMENTS **AGRICOLES**

PUBLICATION PÉRIODIQUE =

EDITION DE LA STATION POITOU CHARENTES CHARENTE - CHARENTE-MARITIME - DEUX-SEVRES - VIENNE SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

ROUTE DE VASLES - BIARD - 86000 POITIERS - TEL. (49) 88.35.55

ABONNEMENT ANNUEL

50 F.

C. C. P. LIMOGES, 4. 752, 22. X. Sous Régisseur de récettes et d'avances AVERTISSEMENTS AGRICOLES Rte de Vasles - Biard - 86000 POITIERS

BULLETIN Nº 62 - JUILLET 1976

malitum entertrog .gon zumager agf . POMMIERS - POIRIERS

CARPOCAPSE

L'évolution très rapide des pontes et des larves fait que le deuxième vol est commencé dans les régions les plus précoces : En Charentes, traiter dès réception. En zones intermédiaires, traiter avant le 10 Juillet.

Dans les Gâtines, contrairement aux années précédentes, le second vol sera très important. Il commencera dès le début de la semaine prochaine et pour assurer une couverture satisfaisante, un premier traitement devra être appliqué vers le 17 Juillet:

ARAIGNEE ROUGE (P. Ulmi) : Les conditions actuelles sont idéales pour le développement de ce ravageur, surveiller les vergers cu les infestations sont fréquentes. Nous rappelons qu'il convient d'éviter les produits favorisants (voir PHYTOMA nº 276 Mars 76) et d'utiliser des acaricides spécifiques si une intervention est nécessaire dans l'immédiat. Sinon, attendre un prochain avis qui donnera des indications sur le " traitement d'été " :

En cas de pluies d'orages provoquant une forte humectation assurer la protection a postériori (traitement curatif) dans les vergers présentant des taches.

Le temps chaud et les quelques pluies d'orages favorisent la maladie. Un traitement mixte " tavelure - ofdium " peut-être envisagé en cas d'extension.

VICNE hebituellement inferthes, les comptagos montrent que

sont très raras en ce moient, et les dégâts Voldim Les rares foyers apparus à la fin mai n'ont pas évolué. Il reste donc imutile de faire un traitement avant un prochain avis, malgré les récentes chutes d'eau.

Nous vous demandons cependant de nous signaler toute apparition de taches qui pourraient survenir à la suite de nouveaux orages importants.

OIDIUM

L'évolution de cette maladie a été bloquée par les très fortes températures de ces dernières semaines. Le retour à un temps plus instable et moins sec permettra un redémarrage. Surveiller les vignes sensibles.

(Eudémis) VERS de la GRAPPE

La répartition des attaques de la première génération a été très hétérogène dans les Charentes. Le Haut-Poitou semble touché de façon plus générale, avec parfois des infestations très fortes.

Japrine à la Station le 7 Juillet 1976 - Préc. Note

Le second vol est repris depuis le 20 Juir environ en Charentes et il arrive à son maximum. Il est encore trop tôt pour traiter. Attendre le prochain avis:

P 240

- Directeur-Gérant : P. JOURNET Imprimerie de la Station Poitou-Charen

Les

ACARIENS

Les manifestations d'"araignées jaunes" sont peu fréquentes : Des attaques d'Acariose ne sont pas rares : surveiller attentivement les vignes. On peut voir aussi des attaques exceptionnelles d'érinose d'été pour lesquelles un simple rognage des extrémités atteintes doit être suffisant.

SOINS à DONNER aux VIGNES GRELEES

Nous rappelons les conseils habituels : 2701 TALLITUE - 53 9/ MITTALITUE

- tailer courts les rameaux non porteurs mutilés
- pour activer la cicatrisation et empêcher le développement éventuel de Rot blanc, on peut faire une application fongicide; mais elle n'est efficace que si elle est réalisée dans les 20 heures qui suivent la grêle.

les Câtines, contrairement aux années précédentes, le second vol sera très - TOWNOO ORD TOTUESE THOU TO ORIENTOCH ORIENTOS AL OB JUGOD OL CRANDES CULTURES TO TROUBE ture satisfalaante, un premier traitement devra être appliqué vers le 17 Julliet.

PYRALE du MAIS

La grande majorité des cultures en sec présente un état végétatif si mauvais que tout traitement est à écarter.

Même pour les Maïs irrigués, ou cultivés en terre profonde, qui permettent d'espérer un rendement correct, l'intérêt des traitements n'est pas du tout évident al cette années toomun etro? enu traupovorq sogaroth saluiq eb sao na

- Le vol a été très perturbé par la sécheresse (blocage des nymphoses). au . elbelem al tras A Poitiers par exemple, les sorties en élevage ont été très faibles. Après un maximum vers le 20-25 Juin, et sont tombées à zéro actuellement. Les captures au piège sexuel donnent des résultats comparables.
- Même en régions habituellement infestées, les comptages montrent que les pontes fraîches sont très rares en ce moment, et les dégâts ont été faibles elitumi onob eter (très inférieurs au seuil de dégâts). que erever seur sel de faire un traitement avant un prochain avis, malgré les récentes chutes d'equ.

Le Chef de la Circonscription Les Ingénieurs chargés des BENEFIT SEMENTS AGRICOLES OF

tations très fortes.

marrage. Surveiller les vignes sensibles.

F. BARBOTIN L'évolution de cette maladie a été bloquée par les très fortes températures de

Imprimé à la Station le 7 Juillet 1976 - Préc. Note : Bulletin Nº 61 - JUIN 1976 -

ces dermières sensines. Le retour à un temps plus instable et moins sec permettre un redé-

annh enegono du papier de presse : 535 AD; al ob semestre seb noititrager al les Charentes. Le Haut-Poitou semble touché de façon plus gérérale, avec parfois des infes-

... ...

ovirus it to setmental no monitore mint of al mingel airgon too lov breses al laive misdoorg of erhoetta .retiar' awog tôt gout eroone tee II .mumixem noa á